

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 2-6-81708222  
**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES  
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
13, Route de la FORET - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL

70/50

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
13, Rte de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 199 (Edition Grandes Cultures n° 8/81 du 26 Mai 1981)

## CEREALES

### MALADIES DU FEUILLAGE ET DES EPIS DES BLES

La période de temps perturbé que nous connaissons depuis la fin avril est favorable à la septoriose des feuilles (*S. tritici*) et à la rouille jaune. Cependant, les durées d'incubation sont longues, et les symptômes d'attaques apparaîtront surtout dans les derniers jours de Mai pour ces deux maladies.

L'oïdium et la rouille brune qui avaient commencé à se développer dans les secteurs les plus chauds de la région (Charentes et Plaine de Niort) sont actuellement bloqués par les basses températures. Surveiller les variétés sensibles (Cocagne, Talent, Hardi, Fidel ...). dès le retour de températures plus élevées.

Préconisations : Nous rappelons les indications de notre bulletin du 12 Mai :

- En Vienne et Nord Deux-Sèvres, le risque dominant est la septoriose du feuillage (*S. tritici*) contre laquelle les produits du type carbendazim + manèbe (ou mancozèbe) donnent satisfaction. Attention toutefois à la rouille jaune sur les variétés sensibles comme Talent.

- En plaine de Niort et dans les Charentes, les rouilles et l'oïdium sont beaucoup plus fréquents, et justifient en général de choisir d'autres produits plus efficaces : Tilt et Vigil, très actifs sur les rouilles, donnent de bons résultats sur *Septoria tritici*, mais sont moyens sur *Septoria nodorum*; Bayleton CF épi, bon sur les deux septorioses et la rouille jaune, est à éviter en cas de forte attaque de rouille brune.

Pour décider une intervention, tenir compte de la présence des maladies sur les 2 feuilles supérieures et des sensibilités variétales, mais également du niveau de productivité espéré : les blés les plus denses sont ceux où les maladies font le plus de dégâts, et où les traitements sont le plus souvent justifiés économiquement.

### PUCERONS - CECIDOMYIES

Il n'y a aucun risque d'infestation grave de pucerons cette année et nous déconseillons les traitements aphicides systématiques.

Par contre, les cécidomyies ont commencé à sortir à la faveur des pluies fréquentes. Mais ces insectes présenteront un risque seulement si les conditions météorologiques deviennent favorables aux pontes, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Observer les parcelles le soir par temps chaud et calme pour repérer ces moucheron en position de ponte sur les épis. Le seul produit homologué est le Serk (2 l/ha) dont l'efficacité est assez moyenne. Les produits à base de fenitrothion, plus efficaces, ne sont pas homologués.

### MALADIES DU FEUILLAGE DES ORGES DE PRINTEMPS

Les parcelles semées tôt doivent être protégées cette année en raison des risques de rhynchosporiose et même de rouille jaune. Réaliser un traitement unique avant gonflement ou au plus tard à la sortie des barbes.

Ne pas traiter les semis trop tardifs pour lesquels la valorisation du traitement est peu probable.

Imprimé à la Station le 26 Mai 1981  
Précédente Note : N° 198 du 12 Mai 1981

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire  
"Poitou-Charentes" : 7449  
R. GUILLEMENET